

Erkältung – 1er-Regal

Erkältungs-Kombis



Husten



Husten



Erkältung



Schnupfensprays



Halsschmerzen



Die Angaben stellen lediglich Produktkategorien für die Zwecke des Category Managements dar.
Bitte beachten Sie für die genauen Indikationen die jeweiligen Gebrauchs-/Fachinformationen der Arzneimittel.

A Sandoz Brand



A Sandoz Brand

Die Angaben stellen lediglich Produktkategorien für die Zwecke des Category Managements dar.
Bitte beachten Sie für die genauen Indikationen die jeweiligen Gebrauchs-/Fachinformationen der Arzneimittel.

ACC® akut 200 mg Hustenlöser, Brausetabletten, ACC® akut 600 mg Hustenlöser, Brausetabletten, Wirkstoff: Acetylcystein. **Zusammensetzung:** Jede Brausetbl. enth. 200/600 mg Acetylcystein. Sonstige Bestandteile: Ascorbinsäure, Citronensäure, Lactose, Mannitol (Ph.Eur.), Na-carbonat, Na-citrat (Ph.Eur.), Na-hydrogencarbonat, Saccharin-Na, Brombeer-Aroma (enth. Sorbitol); zusätzl. f. 600 mg: Na-cyclamat. **Anwendungsgeb.:** Zur Verflüss. des Schleims u. Erleicht. des Abhustens b. erkält.-bedingter Bronchitis. **Gegenanz.:** Überempf.keit geg. Inhaltsst.; zusätzl. f. 200 mg: Kdr. < 2 J.; zusätzl. f. 600 mg: Kdr. < 14 J. **Nebenwirk.:** Überempf.-reakt., anaphylakt. Schock, anaphylaktische/anaphylaktoide Reakt., Kopfschm., Tinnitus, Tachyk., Hämorrhagie, Dyspnoe, Bronchospasmen (überwieg. b. Pat. m. hyperreaktiv. Bronchialsystem b. Asthma bronchiale), Erbrechen, Durchfall, Stomatitis, Bauchschm., Übelk., Dyspepsie, Sodbrennen, Urtikaria, Rash, Angioödem, Juckreiz, Exanthem, Fieber, Gesichtssödeme, Hypotonie, schwere Hautreakt. wie Stevens-Johnson-Syndr. od. Lyell-Syndr., Abnahme der Thrombozytenaggreg. **Warnhinw.:** Enth. Lactose, Sorbitol u. Natriumverbind. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinf. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51015820 **Stand:** April 2023

ACC® Kindersaft, 20 mg/ml Lsg. zum Einnehmen, Wirkstoff: Acetylcystein. **Zusammensetzung:** 1 ml Lsg. zum Einnehmen enth. 20 mg Acetylcystein. Sonstige Bestandteile: Carmellose-Na (Ph.Eur.), Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.), Na-benzoat, Na-edetat (Ph.Eur.), Na-hydroxid, Saccharin-Na, gerein. Wasser, Kirsch-Aroma (enth. Propylenglycol). **Anwendungsgeb.:** Zur Verflüssig. des Schleims u. Erleicht. des Abhustens b. erkältungsbedingter Bronchitis. **Gegenanz.:** Überempf.-keit geg. Inhaltsst.; Kdr. < 2 J. **Nebenwirk.:** Überempf.-reakt., anaphylakt. Schock, anaphylakt./anaphylaktoide Reakt., Kopfschm., Tinnitus, Tachyk., Hämorrhagie, Dyspnoe, Bronchospasmus, Erbrechen, Durchfall, Stomatitis, Bauchschm., Übelk., Sodbrennen, Dyspepsie, Urtikaria, Rash, Angioödem, Juckreiz, Exanthem, Fieber, Gesichtssödeme, Hypotonie, schwere Hautreakt. wie Stevens-Johnson-Syndr. u. Lyell-Syndr., Abnahme der Thrombozytenaggregation, Überempf.-reakt., auch Spätreakt. **Warnhinw.:** Enth. Natrium, Methyl-4-hydroxybenzoat, Na-benzoat u. Propylenglycol. Weit. Einzelh. u. Hinw. siehe Fach- u. Gebrauchsinf. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51015929 **Stand:** April 2023

ACC® akut 600 mg Z Hustenlöser, Brausetabletten: Wirkstoff: Acetylcystein. **Zusammensetzung:** Jede Brausetbl. enth. 600 mg Acetylcystein. Sonstige Bestandteile: Ascorbinsäure, Citronensäure, Lactose, Mannitol (Ph.Eur.), Na-carbonat, Na-citrat (Ph.Eur.), Na-cyclamat, Na-hydrogencarbonat, Saccharin-Na 2 H₂O, Zinksulfat-Monohydrat, Zitronenaroma (enth. Sorbitol). **Anwendungsgeb.:** Zur Verflüss. des Schleims u. Erleicht. des Abhustens b. erkält.-bedingter Bronchitis. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsst., Kdr. & Jugend. < 14 J. **Nebenwirk.:** Überempf.-reakt., anaphylakt. Schock, anaphylaktische/anaphylaktoide Reakt., Kopfschm., Tinnitus, Tachyk., Hämorrhagie, Dyspnoe, Bronchospasmen (überwieg. b. Pat. m. hyperreaktiv. Bronchialsystem b. Asthma bronchiale), Erbrechen, Durchfall, Stomatitis, Bauchschm., Übelk., Dyspepsie, Urtikaria, Rash, Angioödem, Juckreiz, Exanthem, Stevens-Johnson-Syndr. od. Lyell-Syndr., Fieber, Gesichtssödeme, Hypotonie, Abnahme der Thrombozytenaggreg. **Warnhinw.:** Enth. Lactose u. Natrium. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinf. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51012942 **Stand:** Dezember 2019

ACC® direkt 600 mg Pulver zum Einnehmen im Beutel, Wirkstoff: Acetylcystein. **Zusammensetzung:** 1 Beutel enth. 600 mg Acetylcystein. Sonstige Bestandteile: Tripalmitin, Polysorbat 65, Sorbitol (Ph.Eur.), Xylitol, Citronensäure, Na-dihydrogencitrat, Mg-citrat, Carmellose-Na (Ph.Eur.), Aspartam, Brombeer-Aroma [enth. Vanillin, Maltodextrin, D-Glucono-1,5-lacton, Sorbitol, hochdisp. Siliciumdioxid, Mannitol, Mg-carbonat], Mg-stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.]. **Anwendungsgeb.:** Sekretolyt. Behandl. zur Verflüss. des Bronchialsekrets, um das Abhusten b. akuten Atemwegserkrank. b. Erw. und Jugendl. ab 14 J. zu erleichtern. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsst., Kdr. u. Jugendl. < 14 J. **Nebenwirk.:** Überempf.-reakt., anaphylakt. Schock, anaphylakt./anaphylaktoide Reakt., Kopfschm., Tinnitus, Tachyk., Hypotonie, Hämorrhagie, Bronchospasmus, Dyspnoe, Erbrechen, Durchfall, Stomatitis, Bauchschm., Übelk., Dyspepsie, Urtikaria, Rash, Angioödem, Juckreiz, Exanthem, Fieber, Gesichtssödeme, Stevens-Johnson-Syndr., tox. epidermale Nekrolyse, Mind. d. Blutplättchenaggregation. **Warnhinw.:** Enth. Aspartam u. Sorbitol. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinf. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51014148 **Stand:** Februar 2021 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de