

Magen | Darm – 1er-Regal

Schwindel & Erbrechen



Sodbrennen (PPI's)



Magenkrämpfe & Blähungen



Darmgesundheit & Probiotika



Durchfall



Verstopfung



Die Angaben stellen lediglich Produktkategorien für die Zwecke des Category Managements dar.
Bitte beachten Sie für die genauen Indikationen die jeweiligen Gebrauchs-/Fachinformationen der Arzneimittel.



A Sandoz Brand

Macrogol HEXAL® plus Elektrolyte Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, Wirkstoff: Macrogol 3350, Na-chlorid, Na-hydrogencarbonat, K-chlorid. **Zusammensetzung:** 1 Beutel enth. 13,125 g Macrogol 3350, 0,3507 g Na-chlorid, 0,1785 g Na-hydrogencarbonat, 0,0466 g K-chlorid. Sonstige Bestandteile: hochdisp. Siliciumdioxid, Saccharin-Na, Orangen-Aroma (enth. Geschmacksstoffe, Maltodextrin, arab. Gummi, all-rac-7-Tocopherol), Zitronen-Limetten-Aroma (enth. Geschmacksstoffe, Maltodextrin, Mannitol [Ph.Eur.], D-Glucos-1,5-lacton, Sorbitol [Ph.Eur.], arab. Gummi, hochdisp. Siliciumdioxid). **Anwendungsgeb.:** Chron. Obstipation. **Gegenanz.:** Intestinale Obstruktion. od. Perforat. aufgr. v. funkt. od. strukt. Stör. der Darmwand, Ileus schwere entzündl. Darmerkrank. wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, tox. Megacolon), Überempf. geg. Inhaltsst. **Nebenwirk.:** Allerg. Reakt. (einschl. anaphylakt. Reakt.), Dyspnoe, Hautreakt., allerg. Hautreakt. (einschl. Angioödem), Urtikaria, Pruritus, Hautausschlag, Erythem, Dehydrier., Elektrolytverschieb. (Hyper- u. Hypokaliämie, Hyponatriämie), Kopfschmerzen, Abdominalschmerzen, Diarrhö, Erbrechen, Übelk., Dyspepsie, abdomin. Aufbläh., Borborygmen, Flatulenz, Beschw. im Anorektalbereich, periph. Ödeme. **Warnhinw.:** Enth. Na, Kalium u. Sorbitol. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51014788 **Stand:** November 2021

OMEP® HEXAL 20 mg, magensaftresistente Hartkapseln, Wirkstoff: Omeprazol. **Zusammensetzung:** Jede magensaftresist. Hartkapsel enth. 20 mg Omeprazol. Sonstige Bestandteile: Zucker-Stärke-Pellets (Saccharose u. Maisstärke), Hypromellose, Na-dodecylsulfat, Povidon K25, Talkum, schweres Mg-oxid, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer-(1:1)-Disp. 30 % (Ph.Eur.), Triethylcitrat, Gelatine, Titandioxid (E171). **Anwendungsgeb.:** z. Behandl. v. Refluxsympt. (z. B. Sodb., Säurerückfl.) b. Erw. **Gegenanz.:** Überempf.-keit geg. Inhaltsst. od. substituierte Benzimidazole; gemeins. Anwend. m. Nelfinavir. **Nebenwirk.:** Leukopenie, Thrombozytopenie, Agranulozytose, Panzytopenie, Überempfindlichkeitsreakt. (z. B. Fieber, angioneurot. Ödem, anaphylakt. Reakt./Schock), Hyponatriämie, Hypomagnesiämie (kann auch m. einer Hypokaliämie verbunden sein, schwere Hypomagnesiämie kann zu Hypokalzämie führen), Schlaflosigkeit, Erreg.zuständ., Verwirrth., Depress., Aggressivität, Halluzinat., Kopfschmerzen, Schwindel, Parästhesien, Schläfrigkeit, Geschmacksveränd., Verschwommensehen, Vertigo, Bronchospasmen, Bauchschmerzen, Verstopf., Durchfall, Blähungen, Übelk./Erbrechen, Drüsenpolyphen des Fundus (gutartig), Mundtrockenh., Mundschleimhautentzünd., gastrointest. Candidiasis, mikroskop. Kolitis, erhöh. Leberenzymwerte, Hepatitis mit od. ohne Gelbsucht, Leberversagen, Enzephalopathie b. Pat. m. vorbesteh. Lebererkrank., Dermatitis, Juckreiz, Hautausschlag, Urtikaria, Haarausfall, Photosensibilität, akut general. pustulöses Exanthem (AGEP), Arzneim.-wirk. m. Eosinophilie u. system. Sympt. (DRESS), Erythema multif., Stev.-John.-Syndr., tox. epidermale Nekrolyse, subakuter kutaner Lupus erythematoses, Gelenk-/Muskelschmerzen, Muskelschwäche, Tubulointerstit. Nephritis (m. mögl. Fortschreiten zu Nierenversagen), Gynäkomastie, Unwohlsein, periph. Ödeme, vermehrtes Schwitzen. **Warnhinw.:** Enthält Saccharose. Die beigegefügte Trockenmittel-Kapsel darf nicht geschluckt werden. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51015665 **Stand:** Februar 2023

OMEP® HEXAL 20 mg magensaftresistente Tabletten, Wirkstoff: Omeprazol. **Zusammensetzung:** Jede magensaftresist. Tbl. enth. 20 mg Omeprazol (als Omeprazol-Mg [Ph.Eur.]). Sonstige Bestandteile: Sacrose, Maisstärke, D-Glucose, Copovidon, Povidon K 25, Talkum, Titandioxid (E 171), Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer-(1:1)-Disp. 30% (Ph.Eur.), Glycerolmonostearat, Propylenglycol, Stearinsäure (Ph.Eur.) [pflanzl.], Polysorbit 80, Simecon, mikrokrist. Cellulose, Macrogol 6000, Crospovidon (Typ A), hochdisp. Siliciumdioxid, Mg-stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], Hypromellose, Eisen(III)-oxid (E 172). **Anwendungsgeb.:** Zur Behandl. v. Refluxsympt. (z. B. Sodb., Säurerückfluss) b. Erw. **Gegenanz.:** Überempf.-keit geg. Inhaltsst. u./od. substituierte Benzimidazole; gleichzeit. Anwend. m. Nelfinavir. **Nebenwirk.:** Leukopenie, Thrombozytopenie, Agranulozytose, Panzytopenie, Überempfindlichkeitsreakt., z. B. Fieber, angioneurot. Ödem u. anaphylakt. Reaktion/anaphylakt. Schock; Hyponatriämie, Hypomagnesiämie, Hypokalzämie, Hypokaliämie, Schlaflosigkeit, Erreg.-zustände, Verwirrth., Depress., Aggressivität, Halluzinat., Kopfschmerzen, Schwindel, Parästhesien, Schläfrigkeit, Geschmacksveränd., Verschwommensehen, Vertigo, Bronchospasmen, Bauchschmerzen, Verstopfung, Durchfall, Blähungen, Übelk./Erbrech., Drüsenpolyphen d. Fundus (gutartig), Mundtrockenh., Mundschleimhautentzünd., gastrointest. Candidiasis, mikroskop. Kolitis, erhöh. Leberenzymwerte, Hepatitis m. od. ohne Gelbsucht, Lebervers., Enzephalopathie b. Pat. m. vorbesteh. Lebererkrank., Dermatitis, Juckreiz, Hautausschlag, Urtikaria, Haarausfall, Photosensibilität, Erythema multif., Stev.-John.-Syndr., tox. epidermale Nekrolyse, subakuter kutaner Lupus erythematoses, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Muskelschwäche, tubulointerstit. Nephritis (m. mögl. Fortschreiten zu Nierenver.), Gynäkomastie, Unwohlsein, periph. Ödeme, vermehrt. Schwitzen. **Warnhinw.:** Enth. Glucose u. Sacrose (Zucker). Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51010910 **Stand:** März 2023

Pantoprazol HEXAL® bei Sodbrennen, 20 mg magensaftresistente Tabletten, Wirkstoff: Pantoprazol. **Zusammensetzung:** 1 magensaftres. Tbl. enth. 20 mg Pantoprazol (als Pantoprazol-Natrium 1,5 H₂O). Sonstige Bestandteile: Ca-stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], mikrokrist. Cellulose, Crospovidon (Typ A) (Ph.Eur.), Hypromellose, Na-carbonat, hochdisp. Siliciumdioxid, Hypromellose, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E 172), Macrogol 400, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) (Ph.Eur.), Polysorbit 80, Ponceau-4R-Aluminiumsalz, Chinolingelb-Aluminiumsalz, Na-dodecylsulfat, Titandioxid, Triethylcitrat. **Anwendungsgeb.:** Kurzzeit. Behandl. v. Refluxsympt. (z. B. Sodbrennen, saures Aufstoßen) b. Erw. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsst.; gleichzeit. Anw. m. HIV-Proteasehemmern wie Atazanavir od. Nelfinavir. **Nebenwirk.:** Agranulozytose, Leukopenie, Thrombozytopenie, Panzytopenie, Überempf. (inkl. anaphylakt. Reakt./Schock), Hyperlipidämie, erhöh. Lipidwerte (Triglyceride, Cholesterin), Gewichtsveränd., Hyponatriämie, Hypomagnesiämie, Hypokalzämie u. Hypokaliämie (kann mit dem Auftret. v. Hypomagnesiämie in Verb. stehen), Schlafstör., Depress. (u. Verschlimm.), Desorientiertheit (u. Verschlimm.), Halluzinat., Verwirrth. (insb. b. prädisponiert. Pat. sowie d. Verschlimm. bei Vorbestehen d. Sympt.), Kopfschmerzen, Schwindel, Geschmacksstör., Parästhesie, Sehstör. verschwomm. Sehen, Drüsenpolyphen d. Fundus (gutartig), Diarrhö, Übelk., Erbrechen, Trommelbauch, Völlegefühl, Verstopf., Mundtrockenh., Bauchschmerzen, Unwohlsein, mikroskop. Kolitis, erhöh. Leberenzyme (Transaminasen, Gamma-GT), erhöh. Bilirubin, Leberzellschädigung, Gelbsucht, Leberversagen, Ausschlag, Exanthem, Eruption, Pruritus, Urtikaria, Angioödem, Stev.-John.-Syndr., Lyell-Syndr., Erythema multiforme, Lichtempf., (DRESS-Syndr.), subakut. kutan. Lupus erythematoses, Hüft-/Handgelenks-/Wirbelsäulenfraktur, Gelenk-/Muskelschmerz, interstit. Nephritis, Gynäkomastie, Asthenie, Müdigk., erhöh. Körpertemp., periph. Ödeme. **Warnhinw.:** Enth. den Azofarbst. Ponceau-4R-Aluminiumsalz. Die Tbl. als Ganzes schlucken. Nicht kauen. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51014917 **Stand:** November 2021

Perocur® 250 mg, Hartkapseln, Wirkstoff: Trockenhefe aus Saccharomyces cerevisiae HANSEN CBS 5926 (= S. boulardii). **Zusammensetzung:** 1 Hartkaps. enth. 250 mg Trockenhefe aus Saccharomyces cerevisiae HANSEN CBS 5926 entsprechend mind. 2 x 10¹⁰ lebensfähige Zellen/g; lyophilisiert. Sonstige Bestandteile: Lactose, Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], Hypromellose, gereinig. Wasser, Titandioxid (E 171). **Anwendungsgeb.:** Sympt. Behandl. b. akuter Durchfallerkrank., auch Reisediarrh. und Diarrh. unter Sondernährn. Vorbeug. v. Reisediarrh. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsst., Hefeallerg. insb. geg. S. boulardii, Pat. m. zentralem Venenkatheter, schwererkrankte od. immunsupprim. Pat. aufgr. Fungämierisiko. **Nebenwirk.:** Blähungen, Unverträglichkeitsreakt. i. Form v. Juckreiz, Urtikaria, lokal. od. generalisiert. Exanthem sowie Quincke-Ödem, Atemnot u. ana-phylakt. Schock, Fungämierisiko b. Pat. m. zentralem Venenkatheter u. schwererkrankten od. immunsupprim. Pat., Sepsis b. schwererkrankten od. immunsupprim. Pat. **Warnhinw.:** Enth. Lactose. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51014182 **Stand:** Januar 2021

Lopedium® akut bei akutem Durchfall 2 mg Hartkapseln / Lopedium® T akut bei akutem Durchfall 2 mg Tabletten, Wirkstoff: Loperamidhydrochlorid. **Zusammensetzung:** Lopedium akut: Jede Hartkaps. enth. 2 mg Loperamid-HCl. Sonstige Bestandteile: Gelatine, Lactose-Monohydrat, Mg-stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], Maisstärke, Talkum, Eisen(II,III)-oxid, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O, Patentblau V (enth. Na), Titandioxid. Lopedium T akut: Jede Tbl. enth. 2 mg Loperamid-HCl. Sonstige Bestandteile: Ca-hydrogenphosphat-Dihydrat, Carboxymethylstärke-Na (Typ A) (Ph.Eur.), Lactose-Monohydrat, Mg-stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], Maisstärke, hochdisp. Siliciumdioxid. **Anwendungsgeb.:** Symptomatisch. Beh. v. akuten Diarrhöen f. Jugendl. ab 12 J. u. Erw., sofern keine kausale Ther. z. Verfüg. steht; eine über 2 Tage hinausgeh. Behandl. darf nur unter ärztl. Verord. u. Verlaufsbeobacht. erfolgen. **Gegenanz.:** Überempf.-keit geg. Inhaltsst.; Kdr. < 12 J. (Kdr. < 2 J.; Kdr. 2-12 J. nur nach ärztl. Verord.); Zust., b. denen Verlang. der Darmtät. z. vermeiden ist (einschl. Ileus, Megacolon u. toxi. Megacolon). Sofort absetzen, wenn Obstipat., ein aufgetrieb. Leib od. Ileus auftreten. Durchfälle m. Fieber u./od. blutigem Stuhl; Durchfälle währ./nach Einnahme v. Antibiotika (pseudomembr. [antibiotikaassoz.] Colitis); bakt. Darmentzünd., die durch in die Darmwand eindringende Erreger (z. B. Salmonellen, Shigellen u. Campylobacter) hervorgerufen wird; chron. Durchfallerkrank. (nur nach ärztl. Verord.); akuter Schub v. Colitis ulcerosa; Schwangersch., Stillz. **Nebenwirk.:** Überempf.-reakt., anaphylakt. Reakt. (einschl. anaphylakt. Schock), anaphylaktoide Reakt., Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Bewusstlosigkeit, Stupor, Bewusstseinsstörb., erhöh. Muskeltonus, Koordinat.-stör., Miosis, Obstipat., Übelk., Flatulenz, abdominelle Schmerzen u. Beschw., Mundtrockenh., Schmerzen im ob. Abdominaltrakt, Erbrechen, Dyspepsie, Ileus (einschl. paralyt. Ileus), Megacolon (einschl. tox. Megacolon), Glos-sodynie, aufgebläht. Bauch, akute Pankreatitis, Hautausschlag, bullöse Reakt. (einschl. Stevens-Johnson-Syndr., tox. epiderm. Nekrolyse u. Erythema multiforme), Angioödem, Urtikaria, Pruritus, Harnretent., Fatigue. **Warnhinw.:** Enth. Lactose. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51016089 **Stand:** Juli 2023

Vomacur®, 50 mg Tabletten, Wirkstoff: Dimenhydrinat. **Zusammensetzung:** 1 Tbl. enth. 50 mg Dimenhydrinat. Sonstige Bestandteile: Cellulosepulver, Ca-hydrogenphosphat-Dihydrat, Carboxymethylstärke-Na (Typ A) (Ph.Eur.), Lactose-Monohydrat, Mg-stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], hochdisp. Siliciumdioxid. **Anwendungsgeb.:** Vorbeug. u. Behandl. v. Reisekrankh., Schwindel, Übelk. u. Erbrechen. Für Kdr. ab 6 Jahren u. über 30 kg KG, Jugendl. u. Erw. **Hinw.:** Dimenhydr. ist z. allein. Behandl. v. Zytostatika-induz. Übelk. u. Erbrechen nicht geeignet. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsst. u. andere Antihistaminika, akuter Asthma-Anfall, Engwinkelglaukom, Phäochromozytom, Porphyrie, Prostatahyperplasie m. Restharnbild., Krampfanfälle (Epilepsie, Eklampsie), Herzrhyth.-stör. (z. B. Wolff-Parkinson-White Syndrom); generell darf Dimenhydrinat nicht b. einem KG < 6 kg eingesetzt werden. **Nebenwirk.:** Leukopenie, Neutropenie, Thrombozytopenie, hämolyt. Anämie, Urtikaria, Ödem, anaphylakt. Reakt., Angst, Somnolenz, Kopfschmerzen, Benommenh., Schwindelgefühl, Sedier., Mydriasis, Sehstör., Stimmungsschwank., Erinnerungsvermögen eingeschränkt, Gleichgewichtsstör., Aufmerksamkeitsstör., Koordinationsstör., Verwirrth.-zustand, Halluzinat., Schlaflosigkeit, Vertigo, Myasthenie, Sehschärfe vermindert, Orthostasessyndrom, Unruhe, Agitierth., Nervosität, Tremor, extrapyramidale Erkrank., Tachykardie, verstopfte Nase, Mundtrockenh., gastrointest. Erkrank. (z. B. Übelk., Schmerzen im Oberbauch, Erbrechen, Obstipat., Durchfall), hepatische Funktionsstör. (Ikterus, Gelbsucht cholestatisch), Erythem, Ekzem, Angioödem, Purpura, Dermatitis allerg., Photosensibilität, muskuläre Schwäche, Stör. b. der Entleer. der Harnblase, intraokulärer Druck erhöht, Verläng. des QT-Intervalls im EKG. Es besteht, insb. b. Kdr., die Möglichk. des Auftretens paradoxer Reakt. wie Unruhe, Erreg., Schlaflosigkeit, Angstzustände od. Zittern. Ält. Pat.: Gleichgewichtsstör., Verwirr., Schwindel, Gedächtnis- od. Konzentrationsstör. **Warnhinw.:** Enth. Lactose. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51014522 **Stand:** April 2021
Hexal AG, Industriestraße 18, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

Macrogol - 1 A Pharma®, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen: Wirkstoffe: Macrogol 3350, Na-chlorid, Na-hydrogencarbonat, Kaliumchlorid. **Zusammensetzung:** Jeder Beutel enth. 13,125 g Macrogol 3350, 0,3507 g Na-chlorid, 0,1785 g Na-hydrogencarbonat, 0,0466 g Kaliumchlorid. Sonstige Bestandteile: hochdisp. Siliciumdioxid, Saccharin-Na, Orangen-Aroma, Zitronen-Limetten-Aroma (enth. Sorbitol [Ph.Eur.]). **Anwendungsgeb.:** Chron. Obstipation. **Gegenanz.:** Überempf.-keit geg. Inhaltsst.; intestinale Perforat. od. Obstrukt. aufgr. struktureller od. funkt. Stör. d. Darmwand, Ileus, schweren entzündl. Darmerkrank. wie Morbus Crohn u. Colitis ulcerosa sowie tox. Megakolons. **Nebenwirk.:** allerg. Reakt. (einschl. anaphylakt. Reakt., Dyspnoe, Hautreakt.); Pruritus, Hautausschlag, allerg. Hautreakt. einschl. Angioödem, Urtikaria, Erythem; Dehydrier., Elektrolytverschieb. (Hyper- u. Hypokaliämie, Hyponatriämie); Kopfschmerzen; Abdominalschmerzen, Diarrhö, Flatulenz, Erbrechen, Übelk., Dyspepsie, abdomin. Aufbläh., Borborygmen, Beschw. im Anorektalbereich; periph. Ödeme. **Warnhinw.:** Hoher Natriumgehalt. Enth. Sorbitol. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51016014 **Stand:** Juni 2023
1 A Pharma GmbH, Industriestraße 18, 83607 Holzkirchen, www.1apharma.de

Hexal AG

Sitz: Industriestr. 25, 83607 Holzkirchen, Germany
Amtsgericht: München, HRB-Nr. 110375



A Sandoz Brand