

Allergie | Haut – 1er-Regal

allgemeine Antiallergika



Allergie Nase & Auge



topische Antihistaminika & Steroide



Wundheilmittel



Lippenherpes & Nagelpilz



Nagel-, Haut- und Vaginalpilz



SANDOZ

Die Angaben stellen lediglich Produktkategorien für die Zwecke des Category Managements dar.
Bitte beachten Sie für die genauen Indikationen die jeweiligen Gebrauchs-/Fachinformationen der Arzneimittel.



Allergie | Haut – 2er-Regal

Allgemeine
Antiallergika
Wundheilmittel



Allgemeine
Antiallergika
Wundheilmittel



Allergie
Nasensprays
Lippenherpes



Allergie Auge
Nagelpilz



Topische Steroide
Hautpilz



Topische
Antihistaminika &
Narbenprodukte



SANDOZ

Die Angaben stellen lediglich Produktkategorien für die Zwecke des Category Managements dar.
Bitte beachten Sie für die genauen Indikationen die jeweiligen Gebrauchs-/Fachinformationen der Arzneimittel.



Cetirizin HEXAL® bei Allergien, 10 mg Filmtabletten, Wirkstoff: Cetirizindihydrochlorid. **Zusammensetzung:** 1 Ftbl. enth. 10 mg Cetirizindihydrochlorid. Sonstige Bestandteile: mikrokrist. Cellulose, Lactose-Monohydrat, Mg-Stearat (Ph.Eur.), hochdisp. Siliciumdioxid, Hypromellose, Macrogol 4.000, Titandioxid. **Anwendungsgeb.:** Bei Erw. u. Kdr. ab 6 J.: zur Linderung v. nasalen u. okularen Sympt. b. saisonaler u. perennierender allerg. Rhinitis; zur Linderung v. Sympt. b. chron. idiopath. Urtikaria. **Gegenanz.:** Überempf.-keit geg. Inhaltsst., Hydroxyzin od. and. Piperazin-Deriv.; Nierenkrank. im Endstadium sowie einer eGFR (geschätzte glomeruläre Filtrationsrate) < 15 ml/min. **Nebenwirk.:** Schläfrigkeit, Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerz, paradoxe Stimul. d. zentr. Nervensystems, Miktionsbeschwerden, Akkommodationsstörung d. Augen, Mundtrockenheit, Abdominalschmerz, Übelkeit, Pharyngitis, Diarrhö u. Rhinitis (bei Kdr. bis 12 J.), Thrombozytopenie, Überempf.-keit, anaphylakt. Schock, gesteig. Appetit, Agitiertheit, Aggression, Verwirrtheit, Depression, Halluzinationen, Schlaflosigkeit, Tics, Suizidgedanken, Alpträume, Parästhesie, Konvulsionen, Dysgeusie, Synkope, Tremor, Dystonie, Dyskinesie, Amnesie, Gedächtnisstörung, Akkommodationsstörung, verschwomm. Sehen, okulogyre Krise, Vertigo, Tachykardie, auffäll. Leberfkt. (erhöht. Werte f. Transaminasen, alkal. Phosphatase, Gamma-GT u. Bilirubin), Hepatitis, Pruritus, Ausschlag, Urtikaria, Quincke-Ödem, fixes Arznei-Exanthem, akut generalisiert. pustulöses Exanthem, Arthralgie, Myalgie, Dysurie, Enuresis, Harnverhalt, Asthenie, Malaise (allg. Unwohlsein), Ödeme, Gewichtszunahme, nach Absetzen Pruritus u./od. Urtikaria. **Warnhinw.:** Enth. Lactose. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinf. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51015814 **Stand:** November 2022 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

Levocetirizin HEXAL® bei Allergien, Wirkstoff: Levocetirizin-2HCl. **Zusammensetzung:** Jede Filmtbl. enth. 5 mg Levocetirizin-2HCl (entspr. 4,2 mg Levocetirizin). Sonstige Bestandteile: mikrokrist. Cellulose, Lactose-Monohydrat, Mg-Stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], Hypromellose, Macrogol 400, Titandioxid. **Anwendungsgeb.:** Anwend. b. Erw. u. Kdrn. ab 6 J.: z. Linderung v. nasalen u. okularen Sympt. b. saisonaler u. perennierender allerg. Rhinitis; z. Linderung v. Sympt. b. chron. idiopath. Urtikaria. **Gegenanz.:** Überempf.-keit geg. Inhaltsst., Cetirizin, Hydroxyzin od. and. Piperazin-Derivate; Nierenkrank. im Endstadium, eGFR < 15 ml/min u. Dialysepflicht. **Nebenwirk.:** Kopfschmerz, Schläfrigkeit, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Diarrhö, Erbrechen, Obstipation; Schlafstörung; Überempf.-reakt. einschl. Anaphylaxie; Appetitsteigerung, Aggression, Erregung, Halluzinationen, Depression, Schlaflosigkeit, Suizidgedanken, Alpträume; Konvulsion, Parästhesie, Schwindelgefühl, Synkope, Tremor, Geschmacksstörung; Vertigo; Sehstörung, verschwomm. Sehen, Okulogyratation; Palpitat., Tachykardie, Dyspnoe; Übelkeit, Hepatitis; Dysurie, Harnretention; angioneurot. Ödem, fixes Arznei-Exanthem, Pruritus, Hautausschlag, Urtikaria; Myalgie, Arthralgie; Ödeme; Gewichtszunahme, abnorme Leberfunktionswerte. **Warnhinw.:** Enth. Lactose. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinf. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51017385 **Stand:** Januar 2025 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

Lorano® akut, 10 mg Tabletten, Wirkstoff: Loratadin. Zusammensetzung: Jede Tbl. enth. 10 mg Loratadin. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Mg-Stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], Maisstärke, hochdisp. Siliciumdioxid. **Anwendungsgeb.:** Symptomatische Therapie der allerg. Rhinitis u. der chron. idiopath. Urtikaria für Erw. u. Kdr. über 2 J. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsst. **Nebenwirk.:** Kopfschmerz, Überempfindlichkeitsreaktion (einschließlich Angioödem u. Anaphylaxie), Schwindel, Konvulsionen, Tachykardie, Palpitat., Übelkeit, Mundtrockenheit, Gastritis, Leberfunktionsstörung, Hautausschlag, Alopezie, Müdigkeit, Gewichtszunahme; Kdr. im Alter zwischen 2 u. 12 J.: Nervosität, Erw. u. Jgdl.: Schläfrigkeit, Appetitsteigerung, Schlaflosigkeit. **Warnhinw.:** Enth. Lactose. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinf. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51012340 **Stand:** Mai 2018 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

Lorano®Pro 5 mg Filmtabletten, Wirkstoff: Desloratadin. **Zusammensetzung:** Jede Filmtbl. enth. 5 mg Desloratadin. Sonstige Bestandteile: Maisstärke, mikrokrist. Cellulose, Hypromellose, hochdisp. Siliciumdioxid, hydriertes Pflanzenöl (Typ 1), Titandioxid, Macrogol 400, Indigocarmin-Alu.-salz. **Anwendungsgeb.:** Besserung d. Sympt. b. allerg. Rhinitis u. Urtikaria b. Erw. u. Jugendl. ab 12 J. **Gegenanz.:** Überempf.-keit geg. Inhaltsst. od. Loratadin. **Nebenwirk.:** verstärkt. Appetit; Halluzinationen, anormales Verhalten, Aggression, depress. Verstimmung; Kopfschmerz, Schwindel, Schläfrigkeit, Schlaflosigkeit, psychomotor. Hyperaktivität, Krampfanfall; Augentrockenheit; Tachykardie, Herzklappen-, QT-Verlängerung; Mundtrockenheit, Abdominalschmerz, Übelkeit, Erbrechen, Dyspepsie, Diarrhö; Leberenzymserhöhung, erhöht. Bilirubin, Hepatitis, Ikterus; Photosensibilisierung; Myalgie; Ermüdung, Überempfindlichkeitsreaktion (wie Anaphylaxie, Angioödem, Dyspnoe, Pruritus, Hautausschlag u. Urtikaria), Asthenie; Gewichtszunahme; bei Kdr. u. Jgdl. zusätzl.: Arrhythmie u. Bradykardie. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinf. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51015269 **Stand:** Mai 2022 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

Lorano®Pro 0,5 mg/ml Lösung zum Einnehmen, Wirkstoff: Desloratadin. **Zusammensetzung:** 1 ml Lsg. zum Einnehmen enth. 0,5 mg Desloratadin. Sonstige Bestandteile: Sorbitol-Lsg. 70 % (nicht kristallin) (Ph.Eur.), Propylenglycol, Citronensäure-Monohydrat, Na-citrat (Ph.Eur.), Hypromellose, Sucralose, Na-edetat (Ph.Eur.), Tutti-Frutti-Aroma, gereinigt. Wasser. **Anwendungsgeb.:** Besserung d. Sympt. b. Erw., Jgdl. u. Kdr. ab 2 J. b. allerg. Rhinitis u. Urtikaria. **Gegenanz.:** Überempf.-keit geg. Inhaltsst. od. Loratadin. **Nebenwirk.:** verstärkt. Appetit; Halluzinationen, anormales Verhalten, Aggression, depress. Verstimmung; Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, Schwindel, Schläfrigkeit, psychomotor. Hyperaktivität, Krampfanfall; Augentrockenheit; Tachykardie, Herzklappen-, QT-Verlängerung; Mundtrockenheit, Diarrhö; Abdominalschmerz, Übelkeit, Erbrechen, Dyspepsie; Leberenzymserhöhung, erhöht. Bilirubin, Hepatitis, Ikterus; Photosensibilisierung; Myalgie; Ermüdung, Fieber, Überempfindlichkeitsreaktion (wie Anaphylaxie, Angioödem, Dyspnoe, Pruritus, Hautausschlag u. Urtikaria), Asthenie; Gewichtszunahme; bei Kdr. u. Jgdl. zusätzl.: Arrhythmie u. Bradykardie. **Warnhinw.:** Enth. Sorbitol, Propylenglycol u. Natrium. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinf. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51015268 **Stand:** Mai 2022 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

Lorano® Azelastin/Fluticason Allergiespray bei Heuschnupfen 137 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension, Wirkstoff: Azelastinhydrochlorid u. Fluticasonpropionat (Ph.Eur.). **Zusammensetzung:** Jeder ml Suspension enth. 1000 µg Azelastinhydrochlorid u. 365 µg Fluticasonpropionat. 1 Sprühstoß (0,14 g) enth. 137 µg Azelastinhydrochlorid (= 125 µg Azelastin) u. 50 µg Fluticasonpropionat (Ph.Eur.). Sonstige Bestandteile: Na-edetat (Ph.Eur.), Glycerol, mikrokrist. Cellulose, Carmellose-Na (Ph.Eur.), Polysorbat 80 [pflanzl.], Benzalkoniumchlorid-Lsg., 2-Phenylethan-1-ol, Wasser für Inj.-zwecke. **Anwendungsgeb.:** Bei Erw. zur symptomatischen Behandlung der mittelschweren bis schweren saisonalen allerg. Rhinitis nach Erstdiagnose durch einen Arzt, u. wenn eine Monotherapie entw. m. einem intranasalen Antihistaminikum od. einem Glukokortikoid nicht als ausreichend erachtet wird. **Gegenanz.:** Überempf.-keit geg. Inhaltsst. **Nebenwirk.:** Überempfindlichkeitsreaktion einschl. anaphylakt. Reakt., Angioödem (Gesichts- od. Zungenödeme u. Hautausschlag) u. Bronchospasmus; Kopfschmerz, Dysgeusie (unangenehmer Geschmack), unangenehmes Geruchsempfinden, Schwindel, Schläfrigkeit, Benommenheit, Schläfrigkeit; Glaukom, Erhöhung d. Augeninnendrucks, Katarakt, verschwomm. Sehen; Nasenbluten, Beschwerden an d. Nase (einschl. Nasenreiz, Brennen, Jucken), Niesen, trock. Nasenschleimhaut, Husten, Halstrockenheit, Rachenreiz, Perforat. d. Nasenschleimhaut, Schleimhauterosion, Nasengeschwüre; Mundtrockenheit, Übelkeit; Hautausschlag, Pruritus, Urtikaria; Abgeschlagenheit, (Mattigkeit, Erschöpfung), Schwächegefühl; system. Nebenwirkung (insb. bei hohen Dosen über lange Zeiträume); Osteoporose (unter Langzeitanw.). **Warnhinw.:** Enth. Benzalkoniumchlorid u. Polysorbat. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinf. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51017279 **Stand:** August 2025 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

MometaHEXAL® Heuschnupfenspray, 50 Mikrogramm/Sprühstoß Nasenspray, Suspension, Wirkstoff: Mometasonfuroat (Ph.Eur.). **Zusammensetzung:** B. jeder Betät. der Pumpe wird 1 Sprühst. m. einer abgemess. Dos. v. 50 µg Mometasonfuroat (Ph.Eur.) (als Monohydrat) abgegeben. Sonstige Bestandteile: Mikrokrist. Cellulose, Carmellose-Na (Ph.Eur.), Glycerol, Citronensäure-Monohydrat, Na-citrat (Ph.Eur.), Polysorbat 80 [pflanzl.], Benzalkoniumchlorid, Wasser f. Injektionszwecke. **Anwendungsgeb.:** Zur Anwend. b. Erw. zur symptomatischen Behandlung einer saisonalen allerg. Rhinitis, sofern die Erstdiagnose der saisonalen allerg. Rhinitis durch einen Arzt erfolgt ist. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsst., unbehand. Infekt. im Bereich der Nasenschleimhaut (wie Herpes simplex), nach Nasen-OPs od. -verletz. bis zur Ausheilung. **Nebenwirk.:** Pharyngitis, Infekt. der oberen Atemwege, Überempf.-keit (einschließlich anaphylakt. Reakt., Angioödem, Bronchospasmus, Dyspnoe), Kopfschmerz, Glaukom, erhöht. Augeninnendruck, Katarakte, verschwomm. Sehen, zentrale seröse Chorioretinopathie, Epistaxis, Brennen in der Nase, Reiz. in der Nase, nasale Ulzerat., Nasenseptumperforat., Störung des Geschmacks- u. Geruchssinns. **Warnhinw.:** Enth. Benzalkoniumchlorid. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinf. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51013869 **Stand:** September 2020 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

Acic® Creme, 50 mg/g Creme/Acic® Creme bei Lippenherpes, 50 mg/g Creme, Wirkstoff: Aciclovir. **Zusammensetzung:** 1 g Creme enth. 50 mg Aciclovir. Sonst. Bestandt.: Cetylalkohol (Ph.Eur.), Dimeticon 350, dickflüss. Paraffin, Macrogolglycerolstearat (Ph.Eur.), Propylenglycol, weißes Vaselin, ger. Wasser. **Anwendungsgeb.:** Zur lindernden Behandlung v. Schmerzen u. Juckreiz b. bei häufig wiederkehrenden Herpesinfekt. mit Bläschenbildung im Lippenbereich (rezidivierender Herpes labialis). Zusatzl. f. Acic Creme: Zur lindernden Behandlung v. Schmerzen u. Juckreiz b. bei häufig wiederkehrenden Herpesinfekt. mit Bläschenbildung im Genitalbereich (rezidiv. Herpes genitalis). **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsst. od. Valaciclovir. **Nebenwirk.:** Überempfindlichkeitsreaktion v. Soforttyp einschl. Angioödem u. Urtikaria, Vorübergeh. Brennen od. Stechen an d. behandel. Hautabschn., Eintrocknen, Juckreiz u. Abschupp. d. behandel. Haut, Erythem, Kontaktdermatitis. **Warnhinweis:** Enth. Cetylalkohol. Weitere Einzelh. s. Fach- u. Gebrauchsinf. Acic Creme: Verschreibungspflichtig. Acic Creme bei Lippenherpes: Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51014010 **Stand:** Oktober 2020 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

Terbinafin - 1 A Pharma Nagellack gegen Nagelpilz 78,22 mg/ml Wirkstoffhaltiger Nagellack, Wirkstoff: Terbinafin. **Zusammensetzung:** 1 ml Wirkstoffhalt. Nagellack enth. Terbinafin HCl, entspr. 78,22 mg Terbinafin. Sonstige Bestandteile: Ethanol 96% (95,1% - 96,9% (V/V)); 92,6% - 95,2% (G/G), (Hydroxypropyl)chitosan, gereinigt. Wasser. **Anwendungsgeb.:** B. Erw. b. leichten bis mittelschweren Pilzinf. d. Nägel, die durch Dermatophyten u./od. and. Terbinafin-empfindl. Pilze verursacht werden. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsst. **Nebenwirk.:** Erythem, Hautreizung. **Warnhinw.:** Enth. Alkohol (Ethanol). Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinf. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51015050 **Stand:** Februar 2022 1 A Pharma GmbH, 83607 Holzkirchen

SANDOZ

