

Erkältung – 1er-Regal

Erkältungs-Kombis



Husten



Husten



Erkältung



Schnupfensprays



Halsschmerzen



SANDOZ

Die Angaben stellen lediglich Produktkategorien für die Zwecke des Category Managements dar.
Bitte beachten Sie für die genauen Indikationen die jeweiligen Gebrauchs-/Fachinformationen der Arzneimittel.



Erkältung – 2er-Regal

Husten & Erkältungs-Kombis



Husten & Erkältungs-Kombis



Husten & Sinusitis



Husten & Erkältung



Halsschmerzen & Schnupfensprays



Halsschmerzen & Schnupfensprays



SANDOZ

Die Angaben stellen lediglich Produktkategorien für die Zwecke des Category Managements dar.
Bitte beachten Sie für die genauen Indikationen die jeweiligen Gebrauchs-/Fachinformationen der Arzneimittel.



ACC® Kindersaft, 20 mg/ml Lsg. zum Einnehmen, Wirkstoff: Acetylcystein. **Zusammensetzung:** 1 ml Lsg. zum Einnehmen enth. 20 mg Acetylcystein. Sonstige Bestandteile: Carmellose-Na (Ph. Eur.), Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.), Na-benzoat, Na-edetat (Ph. Eur.), Na-hydroxid, Saccharin-Na, gerein. Wasser, Kirsch-Aroma (enth. Propylenglycol). **Anwendungsgeb.:** Zur Verflüssig. des Schleims u. Erleicht. des Abhustens b. erkältungsbedingter Bronchitis. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit geg. Inhaltsst.; Kdr. < 2 J. **Nebenwirk.:** Überempfindlichkeitsreakt., anaphylakt. Schock, anaphylakt./anaphylaktoide Reakt., Kopfschm., Tinnitus, Tachyk., Hämorrhagie, Dyspnoe, Bronchospasmus, Erbrechen, Durchfall, Stomatitis, Bauchschm., Übelk., Sodbrennen, Dyspepsie, Urtikaria, Rash, Angioödem, Juckreiz, Exanthem, Fieber, Gesichtssödem, Hypotonie, schwere Hautreakt. wie Stevens-Johnson-Syndr. u. Lyell-Syndr., Abnahme der Thrombozytenaggregation, Überempfindlichkeitsreakt., auch Spätreakt. **Warnhinw.:** Enth. Natrium, Methyl-4-hydroxybenzoat, Na-benzoat u. Propylenglycol. Weit. Einzelh. u. Hinw. siehe Fach- u. Gebrauchsinf. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51015929 **Stand:** April 2023 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

ACC® akut 200 mg Hustenlöser, Brausetabletten, ACC® akut 600 mg Hustenlöser, Brausetabletten, Wirkstoff: Acetylcystein. **Zusammensetzung:** Jede Brausetbl. enth. 200/600 mg Acetylcystein. Sonstige Bestandteile: Ascorbinsäure, Citronensäure, Lactose, Mannitol (Ph. Eur.), Na-carbonat, Na-citrat (Ph. Eur.), Na-hydrogencarbonat, Saccharin-Na, Brombeer-Aroma (enth. Sorbitol); zusätzl. f. 600 mg: Na-cyclamat. **Anwendungsgeb.:** Zur Verflüss. des Schleims u. Erleicht. des Abhustens b. erkält.-bedingter Bronchitis. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit geg. Inhaltsst.; zusätzl. f. 200 mg: Kdr. < 2 J.; zusätzl. f. 600 mg: Kdr. < 14 J. **Nebenwirk.:** Überempfindlichkeitsreakt., anaphylakt. Schock, anaphylaktische/anaphylaktoide Reakt., Kopfschm., Tinnitus, Tachyk., Hämorrhagie, Dyspnoe, Bronchospasmen (überwieg. b. Pat. m. hyperreaktiv. Bronchialsystem b. Asthma bronchiale), Erbrechen, Durchfall, Stomatitis, Bauchschm., Übelk., Dyspepsie, Sodbrennen, Urtikaria, Rash, Angioödem, Juckreiz, Exanthem, Fieber, Gesichtssödem, Hypotonie, schwere Hautreakt. wie Stevens-Johnson-Syndr. od. Lyell-Syndr., Abnahme der Thrombozytenaggreg. **Warnhinw.:** Enth. Lactose, Sorbitol u. Natriumverbind. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinf. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51015820 **Stand:** April 2023 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

ACC® akut 600 mg Z Hustenlöser, Brausetabletten, Wirkstoff: Acetylcystein. **Zusammensetzung:** Jede Brausetbl. enth. 600 mg Acetylcystein. Sonstige Bestandteile: Ascorbinsäure, Citronensäure, Lactose, Mannitol (Ph. Eur.), Na-carbonat, Na-citrat (Ph. Eur.), Na-cyclamat, Na-hydrogencarbonat, Saccharin-Na 2 H₂O, Zinksulfat-Monohydrat, Zitronenaroma (enth. Sorbitol). **Anwendungsgeb.:** Zur Verflüss. des Schleims u. Erleicht. des Abhustens b. erkält.-bedingter Bronchitis. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit geg. Inhaltsst.; Kdr. & Jugend. < 14 J. **Nebenwirk.:** Überempfindlichkeitsreakt., anaphylakt. Schock, anaphylaktische/anaphylaktoide Reakt., Kopfschm., Tinnitus, Tachyk., Hämorrhagie, Dyspnoe, Bronchospasmen (überwieg. b. Pat. m. hyperreaktiv. Bronchialsystem b. Asthma bronchiale), Erbrechen, Durchfall, Stomatitis, Bauchschm., Übelk., Dyspepsie, Urtikaria, Rash, Angioödem, Juckreiz, Exanthem, Stev-John.-Syndr. od. Lyell-Syndr., Fieber, Gesichtssödem, Hypotonie, Abnahme der Thrombozytenaggreg. **Warnhinw.:** Enth. Lactose, Sorbitol u. Natriumverbind. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinf. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51016023 **Stand:** Juli 2023 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

ACC® direkt 600 mg Pulver zum Einnehmen im Beutel, Wirkstoff: Acetylcystein. **Zusammensetzung:** 1 Beutel enth. 600 mg Acetylcystein. Sonstige Bestandteile: Tripalmitin, Polysorbat 65, Sorbitol (Ph. Eur.), Xylitol, Citronensäure, Na-dihydrogencitrat, Mg-citrat, Carmellose-Na (Ph. Eur.), Aspartam, Brombeer-Aroma (enth. Vanillin, Maltodextrin, D-Glucono-1,5-lacton, Sorbitol, hochdisp. Siliciumdioxid, Mannitol, basisch. Mg-carbonat), Mg-stearat (Ph. Eur.) [pflanzl.]. **Anwendungsgeb.:** Sekretolyt. Behandl. zur Verflüss. des Bronchialsekrets, um das Abhusten b. akuten Atemwegserkrank. b. Erw. u. Jugendl. ab 14 J. zu erleichtern. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit geg. Inhaltsst.; Kdr. unter 2 J. **Nebenwirk.:** Überempfindlichkeitsreakt.; anaphylakt. Schock, anaphylakt./anaphylaktoide Reakt.; Kopfschm.; Tinnitus; Tachyk.; Hämorrhagie; Bronchospasmus, Dyspnoe; Erbrechen, Durchfall, Stomatitis, Bauchschm., Übelk., Dyspepsie; Urtikaria, Rash, Angioödem, Juckr., Exanthem, schw. Hautreakt. wie Stev-John.-Syndr. u. tox. epiderm. Nekrolyse (Lyell-Syndr.) (meist in Kombi. m. min. 1 weit. Arzneimittel.); Fieber, Gesichtssödem; Hypotonie; Minder. d. Thrombozytenaggregat. **Warnhinw.:** Enth. Aspartam u. Sorbitol. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinf. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51017575-02 **Stand:** August 2025 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

SANDOZ

