


# Magen | Darm – 1er-Regal

## Sodbrennen (PPI's)



## Schwindel & Erbrechen



## Magenkrämpfe & Blähungen



## Darmgesundheit & Probiotika



## Durchfall



## Verstopfung



**SANDOZ**

Die Angaben stellen lediglich Produktkategorien für die Zwecke des Category Managements dar.  
Bitte beachten Sie für die genauen Indikationen die jeweiligen Gebrauchs-/Fachinformationen der Arzneimittel.



**OMEP® HEXAL 20 mg, magensaftresistente Hartkapseln, Wirkstoff:** Omeprazol. **Zusammensetzung:** Jede magensaftresist. Hartkapsel enth. 20 mg Omeprazol. Sonstige Bestandteile: Zucker-Stärke-Pellets (Saccharose u. Maisstärke), Hypromellose, Na-dodecylsulfat, Povidon K 25, Talkum, schweres Mg-oxid, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer-(1:1)-Disp. 30 % (Ph.Eur.), Triethylcitrat, Gelatine, Titandioxid (E171). **Anwendungsgeb.:** z. Behandl. v. Refluxsympt. (z. B. Sodbr., Säurerückfl.) b. Erw. **Gegenanz.:** Überempf.-keit geg. Inhaltsst. od. substituierte Benzimidazole; gemeins. Anwend. m. Nelfinavir. **Nebenwirk.:** Leukop., Thrombozytop., Agranulozytose, Panzytop.; Überempf.-reakt. (z. B. Fieber, angioneurot. Ödem, anaphylakt. Reakt./Schock); Hyponatriämie, Hypomagnesiämie (kann auch m. einer Hypokaliämie verbunden sein, schwere Hypomagnesiämie kann zu Hypokalzämie führen); Schlaflosigkeit, Erreg.-zustände, Verwirrth., Depress., Aggressivität, Halluzinat.; Kopfschm., Schwindel, Parästhesien, Schläfrigkeit, Geschmacksveränd.; Verschwommensehen; Vertigo; Bronchospasmen; Bauchschm., Verstopf., Durchfall, Blähungen, Übelk./Erbrechen, Drüsenpolypen des Fundus (gutartig), Mundtrockenh., Mundschleimhautentzünd., gastrointest. Candidiasis, mikroskop. Kolitis; erhöh. Leberenzymwerte, Hepatitis mit od. ohne Gelbsucht, Lebervers., Enzephalopathie b. Pat. m. vorbesteh. Lebererkrank.; Dermatitis, Juckr., Hautausschlag, Urtikaria, Haarausfall, AGEF, DRESS, Erythema multiforme, Stev-John-Syndr., tox. epidermale Nekrolyse, subakuter kutaner Lupus erythematoses; Gelenk-/Muskelschm., Muskelschwäche; Tubulointerst. Nephritis (m. mögl. Fortschreiten zu Nierenvers.); Gynäkomastie; Unwohl., periph. Ödeme, vermehrte Schwitzen. **Warnhinw.:** Enth. Saccharose. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51017251 **Stand:** April 2025 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

**Pantoprazol HEXAL® bei Sodbrennen, 20 mg magensaftresistente Tabletten, Wirkstoff:** Pantoprazol. **Zusammensetzung:** Jede magensaftresist. Tbl. enth. 20 mg Pantoprazol (als Pantoprazol-Na 1,5 H<sub>2</sub>O). Sonstige Bestandteile: Ca-stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], mikrokrist. Cellulose, Crospovidon (Typ A) (Ph.Eur.), Hypromellose, Na-carbonat, hochdisp. Siliciumdioxid, Hypromellose, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H<sub>2</sub>O, Macrogol 400, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) (Ph.Eur.), Polysorbat 80, Ponceau-4R-Aluminiumsalz, Chinolingelb-Aluminiumsalz, Na-dodecylsulfat, Titandioxid, Triethylcitrat. **Anwendungsgeb.:** Kurzzeit. Behandl. v. Refluxsympt. (z. B. Sodbrennen, saures Aufstoßen) b. Erw. **Gegenanz.:** Überempf.-keit geg. Inhaltsst.; gleichzeit. Anw. m. HIV-Proteasehemmern wie Atazanavir od. Nelfinavir. **Nebenwirk.:** Agranulozytose, Leukop., Thrombozytop., Panzytop.; Überempf.-keit (inkl. anaphylakt. Reakt./Schock); Hyperlipidämie, erhöh. Lipidwerte (Triglyceride, Cholesterin), Gewichtsveränd., Hyponatriämie, Hypomagnesiämie, Hypokalzämie u. Hypokaliämie (kann mit dem Auftret. v. Hypomagnesiämie in Verb. stehen); Schlafstör., Depress. (u. Verschlimm.), Desorientierth. (u. Verschlimm.), Verwirrth. (insb. b. prädisponiert. Pat. sowie d. Verschlimm. bei vorbestehen. d. Sympt.); Kopfschm., Schwindel, Geschmackstör., Parästhesie; Sehstör. verschwomm. Sehen; Drüsenpolypen d. Fundus (gutartig), Diarrhö, Übelk., Erbrechen, Trommelbauch, Völlegefühl, Verstopf., Mundtrockenh., Bauchschm., Unwohl., mikroskop. Kolitis; erhöh. Leberenzyme (Transaminasen, Gamma-GT), erhöh. Bilirubin, Leberzellschädig., Gelbsucht, Lebervers.; Ausschl., Exanthem, Eruption, Pruritus, Urtikaria, Angioödem, Stev-John-Syndr., Lyell-Syndr. (TEN), Erythema multiforme, Lichtempf.-keit, DRESS, subakut kutan. Lupus erythematoses; Handgelenks-/Hüft-/Wirbelsäulenfraktur, Gelenk-/Muskelschm.; tubulointerst. Nephritis (TIN) m. mögl. Fortschr. bis z. Nierenvers.; Gynäkomastie; Asthenie, Müdigk., erhöh. Körpertemp., periph. Ödeme. **Warnhinw.:** Enth. den Azofarbst. Ponceau-4R-Aluminiumsalz. Die Tabl. als Ganzes schlucken. Nicht kauen. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51017023 **Stand:** Oktober 2024 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

**Pantoprazol - 1 A Pharma® 20 mg bei Sodbrennen, magensaftresistente Tabletten, Wirkstoff:** Pantoprazol. **Zusammensetzung:** Jede magensaftresist. Tbl. enth. 20 mg Pantoprazol (als Pantoprazol-Na 1,5 H<sub>2</sub>O). Sonstige Bestandteile: Ca-stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], mikrokrist. Cellulose, Crospovidon (Typ A) (Ph.Eur.), Hypromellose, Na-carbonat, hochdisp. Siliciumdioxid, Hypromellose, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H<sub>2</sub>O, Macrogol 400, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) (Ph.Eur.), Polysorbat 80, Ponceau-4R-Aluminiumsalz, Chinolingelb-Aluminiumsalz, Na-dodecylsulfat, Titandioxid, Triethylcitrat. **Anwendungsgeb.:** Kurzzeit. Behandl. v. Refluxsympt. (z. B. Sodbrennen, saures Aufstoßen) b. Erw. **Gegenanz.:** Überempf.-keit geg. Inhaltsst.; gleichzeit. Anw. m. HIV-Proteasehemmern (wie Atazanavir od. Nelfinavir). **Nebenwirk.:** Agranulozytose, Thrombozytop., Leukop., Panzytop.; Überempf.-keit (inkl. anaphylaktisch. Reakt. u. Schock); Hyperlipidämie, erhöh. Lipidwerte (Triglyceride, Cholesterin), Gewichtsveränd., Hyponatriämie, Hypomagnesiämie, Hypokalzämie u./od. Hypokaliämie (kann m. d. Auftreten v. Hypomagnesiämie verbund. sein); Schlafstör., Depress. (u. Verschlimm. besteh. Sympt.), Desorientierth. (u. Verschlimm. besteh. Sympt.), Halluzinat., Verwirrth. (insb. b. prädisponiert. Pat. sowie bei Vorbestehen d. Sympt.); Kopfschm., Schwindel; Geschmackstör., Parästhesie; Sehstör., verschwomm. Sehen; gutart. Drüsenpolypen d. Fundus, Diarrhö, Übelk., Erbrechen, Trommelbauch, Völlegefühl, Verstopf., Mundtrockenh., Bauchschm. u. Unwohl., mikroskop. Kolitis; erhöh. Leberenzyme (Transaminasen, γ-GT), erhöh. Bilirubin, Leberzellschädig., Gelbsucht, Lebervers.; Ausschlag, Exanthem, Eruption, Pruritus, Urtikaria, Angioödem, Stev-John-Syndr., Lyell-Syndr. (TEN), DRESS, Erythema multiforme, Lichtempfindlich., subakut kutan. Lupus erythematoses; Hüft-, Handgelenks- u. Wirbelsäulenfraktur, Gelenk-/Muskelschmerz; tubulointerst. Nephritis (m. mögl. Fortschr. bis zum Nierenver.); Gynäkomastie; Asthenie, Müdigk. u. Unwohl., erhöh. Körpertemp., periph. ödeme. **Warnhinw.:** Enth. Natrium u. Ponceau-4R-Aluminiumsalz. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51016192 **Stand:** September 2023 1 A Pharma GmbH, 83607 Holzkirchen

**Vomacur®, 50 mg Tabletten, Wirkstoff:** Dimenhydrinat. **Zusammensetzung:** 1 Tabl. enth. 50 mg Dimenhydrinat. Sonstige Bestandteile: Cellulosepulver, Ca-hydrogenphosphat-Dihydrat, Carboxymethylstärke-Na (Typ A) (Ph.Eur.), Lactose-Monohydrat, Mg-stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], hochdisp. Siliciumdioxid. **Anwendungsgeb.:** Vorbeug. u. Behandl. v. Reisekrankh., Schwindel, Übelk. u. Erbrechen. Für Kdr. ab 6 Jahren u. über 30 kg KG, Jugendl. u. Erw. Hinw.: Dimenhydr. ist z. allein. Behandl. v. Zytostatika-induz. Übelk. u. Erbrechen nicht geeignet. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsst. u. andere Antihistaminika, akuter Asthma-Anfall, Engwinkelglaukom, Phäochromozytom, Porphyrie, Prostatahyperplasie m. Restharnbild., Krampfanfälle (Epilepsie, Ekklampsie), Herzrhyth.-stör. (z. B. Wolff-Parkinson-White Syndrom); generell darf Dimenhydrinat nicht b. einem KG < 6 kg eingesetzt werden. **Nebenwirk.:** Leukopenie, Neutropenie, Thrombozytopenie, hämolyt. Anämie, Urtikaria, Ödem, anaphylak. Reakt., Angst, Somnolenz, Kopfschmerzen, Benommenh., Schwindelgefühl, Sieder., Mydriasis, Sehstör., Stimmungsschwank., Erinnerungsvermögen eingeschränkt, Gleichgewichtstör., Aufmerksamkeitsstör., Koordinationsstör., Verwirrth.-zustand, Halluzinat., Schlaflosigkeit, Vertigo, Myasthenie, Sehschärfe vermindert, Orthostasesyndrom, Unruhe, Agitierth., Nervosität, Tremor, extrapyramidale Erkrank., Tachykardie, verstopfte Nase, Mundtrockenh., gastrointest. Erkrank. (z. B. Übelk., Schmerzen im Oberbauch, Erbrechen, Obstipat., Durchfall), hepatische Funktionsstör. (Ikterus, Gelbsucht cholestatisch), Erythem, Ekzem, Angioödem, Purpura, Dermatitis allerg., Photosensibilität, muskuläre Schwäche, Stör. b. der Entleer. der Harnblase, intraokulärer Druck erhöh., Verläng. des QT-Intervalls im EKG. Es besteht, insb. b. Kdr., die Möglichk. des Auftretens paradoxer Reakt. wie Unruhe, Erreg., Schlaflosigkeit, Angstzustände od. Zittern. Ält. Pat.: Gleichgewichtstör., Verwirr., Schwindel, Gedächtnis- od. Konzentrationsstör. **Warnhinw.:** Enth. Lactose. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51014522 **Stand:** April 2021 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

**Lopedium® akut bei akutem Durchfall 2 mg Hartkapseln /Lopedium® T akut bei akutem Durchfall 2 mg Tabletten, Wirkstoff:** Loperamidhydrochlorid. **Zusammensetzung:** Lopedium akut: JedeHartkaps. enth. 2mg Loperamid-HCl. Sonstige Bestandteile: Gelatine, Lactose-Monohydrat, Mg-stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], Maisstärke, Talkum, Eisen(II,III)-oxid, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H<sub>2</sub>O, Patentblau V (enth. Na), Titandioxid. Lopedium T akut: JedeTabl. enth. 2mg Loperamid-HCl. Sonstige Bestandteile: Ca-hydrogenphosphat-Dihydrat, Carboxymethylstärke-Na. (Typ A) (Ph.Eur.), Lactose-Monohydrat, Mg-stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], Maisstärke, hochdisp. Siliciumdioxid. **Anwendungsgeb.:** Symptomat. Beh. v. akuten Diarrhöen f. Jugendl. ab 12 J. u. Erw., sofern keine kausale Ther. z. Verfüg. steht; eine über 2 Tage hinausgeh. Behandl. darf nur unter ärztl. Verord. u. Verlaufsbeobacht. erfolgen. **Gegenanz.:** Überempf.-keit geg. Inhaltsst.; Kdr. <12Jr. (Kdr. <2J. u. Kdr. 2-12J. nur nach ärztl. Verord.); Zust., b. denen Verlang. der Darmtät. z. vermeiden ist (einschl. Ileus, Megacolon u. toxi. Megacolon). Sofort absetzen, wenn Obstipat., ein aufgetrieb. Leib od. Ileus auftreten. Durchfälle m. Fieber u./od. blutigem Stuhl; Durchfälle wahr./nach Einnahme v. Antibiotika (pseudomembr. [antibiotikaassoz.] Colitis); bakt. Darmentzünd., die durch in die Darmwand eindringende Erreger (z.B. Salmonellen, Shigellen u. Campylobacter) hervorgerufen wird; chron. Durchfallerkrank. (nur nach ärztl. Verord.); akuter Schub v. Colitis ulcerosa; Schwangersch., Stillz. **Nebenwirk.:** Überempf.-reakt., anaphylakt. Reakt. (einschl. anaphylakt. Schock), anaphylaktoide Reakt., Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Bewusstlosigkeit, Stupor, Bewusstseinsstrüb., erhöh. Muskeltonus, Koordinat.-stör., Miosis, Obstipat., übelk., Flatulenz, abdominale Schmerzen u. Beschw., Mundtrockenh., Schmerzen im ob. Abdominaltrakt, Erbrechen, Dyspepsie, Ileus (einschl. paralyt. Ileus), Megacolon (einschl. toxi. Megacolon), Glossodynie, aufgebläht. Bauch, akute Pankreatitis, Hautausschl., bullöse Reakt. (einschl. Stevens-Johnson-Syndr., tox. epiderm. Nekrolyse u. Erythema multiforme), Angioödem, Urtikaria, Pruritus, Harnretent., Fatigue. **Warnhinw.:** Enth. Lactose. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51016089 **Stand:** Juli 2023 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

**Lopedium® akut lingual 2 mg Schmelztabletten, Wirkstoff:** Loperamidhydrochlorid. **Zusammensetzung:** Jede Schmelztbl. enth. 2 mg Loperamidhydrochlorid (entspr. 1,86 mg Loperamid). Sonstige Bestandteile: Croscarmellose-Na, Aspartam (E951), Mg-stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], Mannitol (Ph.Eur.), Fantasie-Frucht-Aroma, Pulver, UltraSeal 151, S-117772, Givaudan (enth. Arabisches Gummi, Saccharose, Maltodextrin, Triacetin, Propylenglycol u. Aromen) u. Bananen-Aroma, Pulver, 501010 AP 0551, Firmenich (enth. Maltodextrin u. Aromen). **Anwendungsgeb.:** z. symptomat. Behandl. v. akuten Diarrhöen f. Jugendl. ab 12 J. und Erw., sofern keine kausale Therap. z. Verfüg. steht; Behandl. über 2 Tage hinaus nur unter ärztl. Verord. u. Verlaufsbeobacht. **Gegenanz.:** Überempf.-keit geg. Inhaltsst.; Kdr. < 12 J. (Kdr. < 2 J. dürfen nicht behand. werden, Kdr. zw. 2 u. 12 J. nur nach ärztl. Verord.); Zustände, bei denen eine Verlang. der Darmtätigk. z. vermeiden ist (einschl. Ileus, Megacolon, toxi. Megacolon) - sofort absetzen, wenn Obstipat., ein aufgetrieb. Bauch od. Ileus auftreten; akute Dysenterie, gekennzeich. durch Diarrhö m. hoh. Fieber u./od. Blut im Stuhl; Diarrhö, die wahr./nach Anw. v. Antibiotika auftritt (pseudomembran. [Antibiotika-assoz.] Colitis); bakt. Darmentzünd., die durch in die Darmwand eindring. Erreger (z. B. Salmonellen, Shigellen u. Campylobacter) hervorgerufen wird; chron. Durchfallerkrank. (Behandl. v. chron. Diarrhöen nur nach ärztl. Verord.); akuter Schub einer Colitis ulcerosa; Anw. nur nach ärztl. Verord. wenn eine Lebererkrank. besteht od. durchgemacht wurde (da verzög. Abbau von Loperamid mögl.). **Nebenwirk.:** Überempf.-reakt., anaphylakt. Reakt. (einschl. anaphylakt. Schock), anaphylaktoide Reakt.; Kopfschm., Schwindel, Schläfrigkeit, Bewusstlosigkeit, Stupor, Bewusstseinsstrüb., erhöh. Muskeltonus, Koordinat.-stör.; Miosis; Obstipat., Übelk., Flatulenz, abdomin. Schmerzen u. Beschw., Mundtrockenh., Schmerzen im ob. Abdominaltrakt, Erbrechen, Dyspepsie, Ileus (einschl. paralyt. Ileus), Megacolon (einschl. toxi. Megacolon), Glossodynie, aufgeblähter Bauch, akute Pankreatitis; Hautausschlag, bullöse Reakt. (einschl. Stev-John-Syndr., tox. epiderm. Nekrolyse u. Erythema multiforme), Angioödem, Urtikaria, Pruritus; Harnretent.; Fatigue; vorübergeh., brennendes od. prickelndes Gefühl od. d. Zunge (direkt nach d. Einnah.). **Warnhinw.:** Enth. Saccharose u. Aspartam. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51017624 **Stand:** August 2025 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

**Perocur® 250 mg, Hartkapseln, Wirkstoff:** Trockenhefe aus *Saccharomyces cerevisiae* HANSEN CBS 5926 (= S. boulardii). **Zusammensetzung:** 1 Hartkaps. enth. 250 mg Trockenhefe aus *Saccharomyces cerevisiae* HANSEN CBS 5926 entsprechend mind. 2 x 10<sup>10</sup> lebensfähige Zellen/g; lyophilisiert. Sonstige Bestandteile: Lactose, Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzl.], Hypromellose, gereinig. Wasser, Titandioxid (E 171). **Anwendungsgeb.:** Sympt. Behandl. b. akuter Durchfallerkrank., auch Reisediarrh. und Diarrh. unter Sondernernähr. Vorbeug. v. Reisediarrh. **Gegenanz.:** Überempf. geg. Inhaltsst., Hefeallerg. insb. geg. S. boulardii, Pat. m. zentralem Venenkatheter, schwererkrankte od. immunsupprim. Pat. aufgr. Fungämierisiko. **Nebenwirk.:** Blähungen, Unverträglichkeitsreakt. i. Form v. Juck-reiz, Urtikaria, lokal. od. generalisiert. Exanthem sowie Quincke-Ödem, Atemnot u. ana-phylakt. Schock, Fungämierisiko b. Pat. m. zentralem Venenkatheter u. schwerkranken od. immunsupprim. Pat., Sepsis b. schwerkranken od. immunsupprim. Pat. **Warnhinw.:** Enth. Lactose. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51014182 **Stand:** Januar 2021 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

**SANDOZ**

